

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-интим капель (Стоп-интим капли 2, Стоп-интим капли 3) для
регуляции половой охоты у кошек и собак
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-интим капли (Стоп-интим капли 2, Стоп-интим капли 3) [Stop-intim drops (Stop-intim drops 2, Stop-intim drops 3)].

Международное непатентованное наименование: мегестрол.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Стоп-интим капли в качестве действующего вещества содержит мегестрола ацетат. Выпускают препарат в двух дозировках: «Стоп-интим капли 2» с содержанием мегестрола ацетата - 20 мг/мл, и «Стоп-интим капли 3» с содержанием мегестрола ацетата - 30 мг/мл. В качестве вспомогательных компонентов препарат содержит натрия бензоат и рафинированное растительное масло (подсолнечное или оливковое).

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до желтого цвета, при хранении допускается выпадение осадка, исчезающего при взбалтывании.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 2; 2,5; 3; 3,5 мл в полимерных флаконах-капельницах в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами. Каждый флакон с препаратом помещают в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Стоп-интим капли следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп-интим капли относятся к гормональным лекарственным препаратам.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена и обладает свойством ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным.

При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрол ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 48 часов.

Стоп-интим капли по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Стоп-интим капли назначают самкам для задержки и прерывания течки; самцам – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказанием к применению Стоп-интим капель является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет.

13. Стоп-интим капли вводят перорально за 1-2 часа до кормления, капая с помощью капельницы на корень языка или на кусочек лакомства. Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать в течение 1-2 минут.

Доза препарата зависит от вида, пола, массы животного и цели его применения.

Кошкам применяют препарат «Стоп-интим капли 2»:

- с целью задержки течки - в период между течками один раз в неделю в дозе 4 капли на животное. Курс применения препарата – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

- с целью прерывания течки - при появлении первых признаков течки (но не позднее чем через 3 дня от ее начала) 5-7 раз с интервалом 24 часа в дозе 9 капель на животное.

Сукам применяют препарат «Стоп-интим капли 3»:

- с целью задержки течки - за 7-15 дней до начала течки в дозе 3 капли на 5 кг массы животного ежедневно. Курс применения – не более 32 дней. В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

- с целью прерывания течки - при появлении первых признаков течки (но не позднее чем через 3 дня от ее начала) в суточной дозе 12 капель на 5 кг массы животного. Первые три дня препарат применяют в суточной дозе, последующие 7 дней – по 1/2 суточной дозы.

В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Самцам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в следующих суточных дозах:

- котам «Стоп-интим капли 2» – 8 капель на животное;

- кобелям «Стоп-интим капли 3» – 12 капель на 5 кг массы животного.

Первые 7 дней лекарственный препарат применяют в суточной дозе, последующие 14 дней по 1/2 суточной дозы.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.

16. Не следует применять препарат неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

19. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-интим капель с кортикостероидами. Информация об особенностях взаимодействия с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

20. Стоп-интим капли не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе со Стоп-интим каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время применения препарата запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-интим каплями.

Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская
область, Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская
область, Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп-интим каплей, утвержденная Россельхознадзором от 09 июня 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3- № П/ВР-3-46/01691