

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ошейника инсектоакарицидного Беафар для собак и кошек С.О.С.
для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

(организация-разработчик фирма «Beaphar B.V.», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. (Collar Beaphar for dogs and cats insectoacaricide S.O.S.).

Международное непатентованное наименование: тетрахлорвинфос.

2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник

Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. содержит в качестве действующего вещества – фосфорорганическое соединение тетрахлорвинфос – 14,2 %, а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридная смесь – 85,8 %.

По внешнему виду препарат представляет собой белую полихлорвиниловую ленту с фиксатором, длиной 60 см или 70 см для собак и длиной 35 см – для кошек.

3. Выпускают Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С., упакованным в герметично закрытый полимерный пакет, помещенный в картонную коробку с инструкцией по применению.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5⁰С до 30⁰С. Срок годности Ошейника инсектоакарицидного Беафар для собак и кошек С.О.С. при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства.

Запрещается использовать Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. по истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. относится к группе инсектоакарицидных препаратов. Тетрахлорвинфос – действующее вещество ошейника, относится к фосфорорганическим соединениям. Обладает выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых стадий развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Тетрахлорвинфос, выделяясь с поверхности ленты, переносится на

кожно-волосистой покров животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия тетрахлорвинфоса заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и иксодовых клещей, в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

8. Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. применяют собакам и кошкам, щенкам и котятм старше 6-месячного возраста для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

9. Ошейник инсектоакарицидный Беафар для собак и кошек С.О.С. не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным самкам, а также щенкам и котятм моложе 6-месячного возраста.

10. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепляют фиксатором, и излишек ленты срезают.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Постоянное ношение Ошейника инсектоакарицидного Беафар для собак и кошек С.О.С. обеспечивает защиту собак и кошек от насекомых и иксодовых клещей в течение 4 месяцев.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

13. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению эффективности.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Ошейника инсектоакарицидного Беафар для собак и кошек С.О.С. в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к тетрахлорвинфосу, возможны индивидуальные реакции (избыточная сливация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Ошейником инсектоакарицидным Беафар для собак и кошек С.О.С. необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. Владелец животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками. Животное с Ошейником инсектоакарицидным Беафар для собак и кошек С.О.С. не следует подпускать к маленьким детям, особенно к грудным младенцам.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ошейником инсектоакарицидным Беафар для собак и кошек С.О.С. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата и использованный ошейник запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: фирма «Beaphar B.V.»; P.O. Box 7, 8100 AA Raalte, Holland.

Инструкция разработана компанией «Beaphar Eastern Europe, s.r.o.» (Чешская Республика) совместно с фирмой «Beaphar B.V.» (Нидерланды).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Ошейника инсектоакарицидного Беафар для собак и кошек С.О.С., утвержденная Россельхознадзором 16.04.2009 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: