

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ЛАКТОБИФАДОЛА для профилактики и лечения дисбактериозов и повышения естественной резистентности организма животных, в том числе птицы (организация-разработчик ООО БФ «Компонент», г. Бугуруслан, Оренбургской области)

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое название: ЛАКТОБИФАДОЛ

Международное непатентованное название (МНН): LACTOBIFADOLUM.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения. Содержит высушенную сорбционным методом микробную массу молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* ЛГ1-ДЕП-ВГНКИ, бифидобактерий *Bifidobacterium adolescentis* В-1-ДЕП-ВГНКИ и наполнитель – муку пшеничную.

По внешнему виду ЛАКТОБИФАДОЛ представляет собой однородный сыпучий порошок бежевого цвета

3. ЛАКТОБИФАДОЛ расфасован по 50, 100, 500, 1000 г в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты. Фасовка, содержащая 50 г ЛАКТОБИФАДОЛА, упаковывается во вторичную картонную упаковку, фасовки по 100, 500 и 1000 г выпускаются без вторичной упаковки.

Каждую единицу потребительской упаковки и каждую коробку с препаратом снабжают инструкцией по применению.

Срок годности ЛАКТОБИФАДОЛА, 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности ЛАКТОБИФАДОЛ к применению не пригоден.

4. ЛАКТОБИФАДОЛ хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом темном месте при температуре от 2 до 10° С. Допускается транспортирование при температуре не выше 25° С в течение 15 дней.

5. ЛАКТОБИФАДОЛ хранят в недоступном для детей месте.

6. Препарат в пакетах без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примесей, а также остатки препарата, не использованные в день вскрытия пакета, подлежат выбраковке.

Утилизация ЛАКТОБИФАДОЛА не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Лечебно-профилактический эффект препарата обеспечивается за счет восстановления и поддержания в кишечнике животных высокого популяционного уровня ацидофильных и бифидобактерий. Размножаясь, эти бактерии выделяют молочную кислоту и другие биологически активные субстанции, которые сдерживают развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе эшерихий, протей, сальмонелл, стафилококков, активизируют обмен веществ, усиливают реакции неспецифического иммунитета, в результате чего повышается сохранность поголовья.

В одном грамме препарата содержится не менее $1,0 \times 10^6$ КОЕ (колониеобразующих единиц) живых клеток молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* ЛГ1-ДЕП-ВГНКИ и $8,0 \times 10^7$ КОЕ живых клеток бифидобактерий *Bifidobacterium adolescentis* В-1-ДЕП-ВГНКИ

III ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. ЛАКТОБИФАДОЛ применяют для профилактики и лечения дисбактериозов и повышения естественной резистентности организма животных, в том числе и птицы.

9. Противопоказаний к применению не установлено.

10. ЛАКТОБИФАДОЛ применяют ежедневно индивидуальным или групповым методом, смешивая его с кормом, молозивом, молоком или кипяченой водой.

Рекомендуемые дозы:

- новорожденным телятам, поросятам, жеребят по 0,2-0,4 г/кг массы животного в сутки один раз в день в течение 5-7 дней;
- крупному рогатому скоту, лошадям по 25-30 г/гол. в сутки один раз в день в течение 20-30 дней;
- свиньям на откорме, свиноматкам по 15-20 г/гол. в сутки один раз в день в течение 20-30 дней;
- пушным зверям, кошкам, собакам по 0,2-0,4 г/кг массы животного в сутки один раз в день в течение 5-7 дней;
- бройлерным цыплятам по 1 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней;
- молодкам и взрослым курам-несушкам по 1,5 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней.

Корма и кормосмеси с препаратом термической обработке подвергать запрещается.

11. Симптомов проявления токсикозов или других нежелательных реакций при передозировке препарата ЛАКТОБИФАДОЛА не установлено.

12. Особенности действия ЛАКТОБИФАДОЛА при первом приеме или при его отмене не установлено.

13. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены, прерванный курс лечения и профилактики продолжают.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

15. В период применения препарата пероральное введение антибиотиков и других химиотерапевтических веществ не рекомендуется. Внутримышечное применение антимикробных препаратов при наличии показаний не ограничивается.

16. Продукцию животноводства и птицеводства после применения ЛАКТОБИФАДОЛА реализуют без ограничений.

IV МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При применении препарата ЛАКТОБИФАДОЛ следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

18. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.

19. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки с мылом. При попадании на кожу и/или слизистые оболочки рекомендуется промыть их большим количеством водопроводной воды.

20. Организация-производитель: ООО БФ «Компонент», 462631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д.51.

Инструкция разработана: ООО БФ «Компонент», 462631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д. 51.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции отменяется «Инструкция по применению ЛАКТОБИФАДОЛА для профилактики и лечения дисбактериозов и повышения естественной резистентности организма животных, в том числе птицы», утвержденная Россельхознадзором 03 марта 2009 года.