

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Дирофен таблеток для
дегельминтизации взрослых собак и кошек, щенков и котят

(организация-разработчик ООО «Апи-Сан», г. Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дирофен таблетки (Dirophen tabulettae).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: фенбендазол и пирантела памоат.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Дирофен таблетки выпускают в двух формах: 0,5 г (для взрослых кошек и собак) и 0,2 г (для котят и щенков). Препарат в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 0,5 г и массой 0,2 г содержит в качестве действующих веществ соответственно: фенбендазол – 250 мг и 50 мг; пирантела памоат – 75 мг и 15 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу – 75 мг и 35 мг и карбоксиметилцеллюлозу – 100 мг. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки от белого до серо-белого цвета с риской.

3. Выпускают препарат в блистерах из ламинированной бумаги, упакованных в картонные пачки.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от минус 10 °С до 20 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Дирофен таблеток по истечении срока годности.

5. Дирофен таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Дирофен таблетки относятся к комбинированным антигельминтным лекарственным препаратам.

Препарат обладает широким спектром антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в том числе *Toxocara canis*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Multiceps multiceps*.

Механизм действия фенбендазола и пирантела памоата, входящих в состав лекарственного препарата, основан на ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена,

что вызывает паралич и гибель гельминтов и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

При пероральном введении фенбендазол частично всасывается в кишечнике и выводится из организма в основном с фекалиями и в меньшей степени с мочой в течение 24 – 48 часов. Пирантела памоат практически не всасывается и выводится из организма в основном в неизмененном виде с фекалиями.

Дирофен таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают эмбриотоксического, тератогенного и сенсibilизирующего действия. Хорошо переносятся собаками и кошками разных пород и возраста.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Дирофен таблетки назначают взрослым кошкам и собакам, котятam и щенкам с 3-недельного возраста с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестодоз) и смешанных нематодо-цестодозных инвазиях.

9. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Дирофен таблетки не следует применять самкам в первой половине беременности, щенкам и котятam моложе 3-недельного возраста, истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

Беременным самкам препарат назначают за 3 недели до предполагаемых родов с осторожностью, под наблюдением ветеринарного врача, кормящим самкам – через 2-3 недели после родов.

10. Дирофен таблетки применяют животным индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма (в куске колбасы, мяса, с фаршем, кашей): взрослым собакам и кошкам в дозе 1 таблетка массой 0,5 г на 5 кг массы животного, котятam и щенкам – 1 таблетка массой 0,2 г на 1 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

При сильной степени инвазии дегельминтизацию рекомендуется повторить через 10 дней.

С профилактической целью дегельминтизацию проводят в терапевтической дозе ежеквартально, а также перед каждой вакцинацией.

11. При значительной передозировке у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройства желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Препарат предназначен для однократного применения.

14. При применении Дирофен таблеток в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

15. Дирофен таблетки не следует применять одновременно с пиперазином и средствами, ингибирующими холинэстеразу.

16. Дирофен таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Дирофен таблетками следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дирофен таблетками. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «Апи-Сан»; 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3/1, кв. 222.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Дирофен таблеток, утвержденная Россельхознадзором от 25 сентября 2006.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения