

ИНСТРУКЦИЯ по применению Зоодерма для лечения болезней кожи и отитов собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Зоодерм (Zooderm).
Международное непатентованное наименование: гидроксиметилхиноксилиндиоксид (диоксидин), дифенгидрамин (димедрол).
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Зоодерм в качестве действующих веществ содержит диоксидин - 2% и димедрол - 0,5%, а в качестве вспомогательных веществ диметилсульфоксид - 30% и пропиленгликоль до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.
3. Зоодерм выпускают расфасованным по 5 мл в стеклянные флаконы, по 10 и 15 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные крышками-капельницами или резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в индивидуальную картонную коробку и снабжают инструкцией по применению.
4. Зоодерм хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰С до 20⁰С.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки Зоодерм хранится в течение срока годности при закрытой крышке.
Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.
5. Зоодерм следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Зоодерм – комплексный антибактериальный, противовоспалительный препарат.
Диоксидин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамотрицательных и грамполо-

жительных микроорганизмов, включая протей, синегнойную палочку, клебсиеллу, сальмонелл, шигелл, стафилококки, стрептококки и клостридии. Механизм действия диоксидина заключается в избирательном угнетении процесса синтеза ДНК в микробной клетке, что вызывает морфологические изменения клеточной стенки и генетического материала бактерий. Диоксидин подавляет активность внеклеточной бактериальной нуклеазы и α -токсина, при местном применении диоксидин ускоряет процессы регенерации и эпителизации поврежденных тканей.

Димедрол обладает выраженной противогистаминной активностью, оказывает местноанестезирующее действие, устраняет отечность, болезненность и зуд.

Диметилсульфоксид способствует проникновению диоксидина и димедрола в очаг поражения, чем достигается терапевтический эффект при воспалительных процессах, в том числе гнойных, бактериальной этиологии.

Зоодерм по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Зоодерм применяют наружно в качестве антимикробного и противовоспалительного средства собакам и кошкам при отитах, дерматитах, вяло заживающих ранах, вульвовагинитах, баланопоститах, стафилококковой пиодермии и других заболеваниях кожи бактериальной этиологии.

9. Противопоказания к применению препарата не установлены.

10. При отитах перед обработкой тщательно очищают ушные раковины от поверхностных корок и струпьев тампоном, смоченным Зоодермом, а затем закапывают Зоодерм пипеткой в каждое ухо в зависимости от массы животного: кошкам и маленьким собакам по 0,5 мл, средним собакам по 1 мл, крупным по 2 мл. Обработку проводят два раза в сутки в течение 7-10 дней до выздоровления животного.

При свищах и баланопостите обработку проводят путем двух-трех кратного промывания полостей с помощью шприца с катетером по 2-5 мл Зоодерма в течение 7-10 дней с интервалом 2-3 дня.

При абсцессах и флегмонах после их вскрытия и промывания в полость вводят смоченные Зоодермом тампоны, которые меняют два раза в день до полного очищения ран от гнойно-некротических масс. С началом процесса грануляции и заживления нанесение Зоодерма осуществляют один раз в 2-3 дня.

При пиодермии и гнойничковых заболеваниях кожи пораженные места обрабатывают Зоодермом, нанося его на пораженные участки путем аппликаций или протирания два-три раза в день в течение 5-10 дней.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении Зоодерма в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о взаимодействии Зоодерма с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Зоодерм не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Зоодермом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Зоодермом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

Инструкция разработана: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Зоодерма, утвержденную Россельхознадзором 2 марта 2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Директор ЗАО «Топ-Вет»

А.А. Черных