

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

07 ИЮН 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«КОЛВИТАМ® Холин Хлорид 60%»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00769**

Торговое наименование кормовой добавки:
«КОЛВИТАМ® Холин Хлорид 60%» («KOLVITAM® Choline Chloride 60%»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: холин хлорид (полученный путём химического синтеза) 60,0-63,0 %; вспомогательное вещество: измельченный стержень кукурузного початка (носитель) до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание холин хлорида 60,0-63,0 %, массовая доля влаги не более 5,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг, 40 кг, 50 кг в бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 650 кг, 750 кг, 800 кг, 1000 кг, 1200 кг в биг-беги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Порошок от жёлтого до коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:
24 месяца с даты производства.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 30 °С до 35 °С, и относительной влажности не более 75 %.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Холин хлорид является предшественником холина, который играет важную роль в развитии организма животных и птиц в целом. Он предупреждает жировую инфильтрацию печени, усиливает синтез и накопление гликогена в печени, является источником метиловых групп в процессе синтеза метионина, креатина, карнитина, адреналина, метилникотинамида – исходным веществом для синтеза ацетилхолина. Применение холин хлорида способствует повышению продуктивности свиней, сельскохозяйственной птицы и осетровых рыб.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для производства премиксов и комбикормов, а также повышения продуктивности свиней, сельскохозяйственной птицы и осетровых рыб.

Показания для применения:

Повышение продуктивности свиней, сельскохозяйственной птицы и осетровых рыб.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- индейке на откорме: 1100-1200 г/т корма;
- курам-несушкам: 300-600 г/т корма;
- цыплятам-бройлерам: 500-1000 г/т корма;
- свиньям на откорме: 400-600 г/т корма;
- супоросным и подсосным свиноматкам: 500-800 г/т корма;
- пороссятам-отъемышам: 400-600 г/т корма;
- рыбе осетровых пород: 600-1000 г/т корма.

Количество вводимого холин хлорида определяется уровнем витаминов в составе корма, а также вида и возраста животных, в соответствии с существующими в Российской Федерации нормами и технологией ввода витаминов.

Нормы ввода могут быть изменены исходя из кормовой базы, но в соответствии с нормами, существующими в Российской Федерации.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в премиксы, корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Кормовая добавка может подвергаться кратковременному воздействию высоких температур (не более 110 °C) в течение 30 минут во время изготовления кормов, комбикормов и премиксов.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «Агритек Био», 195027, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Большеохтинский, д. 4, Литер А, этаж 3, офис 384.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.», No. 211, Baiyun 6th Road, Haosheng Street Office, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.», No. 211, Baiyun 6th Road, Haosheng Street Office, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «КОЛВИТАМ® Холин Хлорид 60%» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.