

ИНСТРУКЦИЯ

по применению капель глазных и интраназальных Анандин
для лечения конъюнктивитов и ринитов у собак и кошек

(организация-разработчик: ООО «НИО «Медитэр»,
г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные и интраназальные Анандин.

Международное непатентованное наименование действующего вещества: глюкаминопропилкарбакридон.

2. Лекарственная форма: капли глазные и интраназальные.

Лекарственный препарат капли глазные и интраназальные Анандин содержит в качестве действующего вещества глюкаминопропилкарбакридон - 2%, а в качестве вспомогательных веществ глицерин - 5% и воду для инъекций - до 100%. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.

3. Выпускают капли глазные и интраназальные Анандин расфасованными по 5 мл во флаконы из нейтрального стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается применять Капли глазные и интраназальные Анандин по истечении срока годности.

5. Капли глазные и интраназальные Анандин следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Анадин относится к иммуномодуляторам.

Входящий в состав капель глюкаминопропилкарбакридон (анандин), относится к группе низкомолекулярных индукторов цитокинов и обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Глюкаминопропилкарбакридон стимулирует выработку эндогенного интерферона, повышает функциональную активность Т-лимфоцитов и макрофагов, активизирует продукцию провоспалительных цитокинов.

Капли глазные и интраназальные Анадин по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Капли глазные и интраназальные Анадин применяют в комплексной терапии конъюнктивитов и ринитов различной этиологии у собак и кошек.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата служит повышенная индивидуальная чувствительность животного к входящим в состав препарата компонентам.

10. При конъюнктивитах препарат закапывают по 2-3 капли за нижнее веко два раза в день, при ринитах — по 2-4 капли в каждый носовой ход два-три раза в день. Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 14 дней. Во время лечения препаратом не требуется специальных условий содержания и кормления животных.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия при начале приёма препарата и при его отмене не установлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении капель глазных и интраназальных Анадин в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении признаков выраженного раздражения применение лекарственного средства прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

15. Капли глазные и интраназальные Анадин совместимы с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

16. Так как препарат предназначен для непродуктивных животных сроки возможного использования продукции животного происхождения не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с каплями глазными и интраназальными Анандин следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями глазными и интраназальными Анандин. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация производитель: ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр» (ООО «НИО «Медитэр»); 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 4 А, л. А. Адрес места производства: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 9.

Инструкция разработана: ООО «НИО «Медитэр», 197046, Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.4 А, л. А.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкцию по применению капель глазных и интраназальных Анандин, утвержденная Россельхознадзором 30.06.2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения