

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению препарата Дилабик для лечения  
варроатоза пчел

( организация–разработчик: ООО НПП «Биотех БК» г. Мытищи Моск. обл.)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дилабик (Dilabic).  
Международное непатентованное наименование лекарственного  
препарата: амитраз.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.  
Дилабик содержит в качестве действующего вещества амитраз -12,5 %, а в  
качестве вспомогательных веществ - эмульгатор неонол АФ-10 – 12% и  
растворитель - о-ксилол до 100%. По внешнему виду представляет собой  
прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Выпускают Дилабик расфасованным по 0,5 и 1,0 мл в герметично  
запаянные стеклянные ампулы, которые укладывают по 10 штук в  
картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3  
года со дня производства. Запрещается использовать Дилабик по истечении  
срока годности.

4. Хранят Дилабик в закрытой упаковке производителя в сухом,  
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых  
продуктов и кормов, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.

5. Дилабик следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с  
требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

7. Дилабик – акарицидный препарат.

Амитраз, входящий в состав препарата обладает кишечным и  
контактным действием против взрослых форм клещей *Varroa Jakobsoni*.  
Механизм действия амитраза заключается в воздействии на октопаминовые  
рецепторы клещей, что вызывает блокаду проводимости нервных импульсов,  
нарушение двигательных рефлексов, паралич и гибель паразита.

Дилабик по степени воздействия на организм относится к умеренно  
опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Препарат не  
токсичен для пчел, в рекомендуемой препаративной форме и дозе  
не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и  
продуктивность семей пчел, не накапливается в продуктах пчеловодства.

### III. Порядок применения.

8. Дилабик применяют для лечения варроатоза пчел.

9. Противопоказано применение препарата при температуре внешнего воздуха весной не ниже 12°C, а осенью не ниже 10°C.

10. Дилабик применяют в весенний период после первого осмотра пчел и в летне-осенний период после откачки товарного меда при отсутствии в пчелиных семьях расплода. За 15- 20 минут до обработки семей готовят рабочую эмульсию Дилабика. С этой целью 0,5 мл препарата разводят в 1 л чистой водопроводной воды и тщательно перемешивают в течение 1 минуты до образования опалесцирующей эмульсии светло - молочного цвета.

Обработку пчелиных семей при варроатозе проводят рабочей эмульсией препарата двукратно с интервалом 7 дней из расчета 10 мл на ульочку пчел. Обработку проводят одновременно во всех ульях.

Приготовленная рабочая эмульсия пригодна для применения в течение одного рабочего дня.

Обработку пчелиных семей во избежание попадания препарата в товарный мед прекращают за месяц до главного медосбора.

11. При передозировке препарата наблюдается беспокойство и выкушивание пчел из ульев, увеличивается гибель пчел.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. При применении Дилабика в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Дилабика с другими лекарственными и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Мед, полученный от семей, обработанных препаратом Дилабик, в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Дилабиком следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором.

18. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дилабиком. В случае появления аллергических реакций или случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата, запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: ООО НПП «Биотех БК», 141011, г. Мытищи Московской области, Пионерский переулок, д. 5

Инструкция разработана ООО НПП «Биотех БК» 141011, г. Мытищи Московской области, Пионерский переулок, д. 5

С утверждением настоящей инструкции считать утратившую силу инструкцию по применению Дилабика, утвержденную Россельхознадзором 11 декабря 2006 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

Генеральный директор  
ООО НПП «Биотех БК»

Баньковский В.В.