

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины против анаэробной энтеротоксемии
и эшерихиоза поросят ассоциированной
(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамален, д. 16)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование - Вакцина против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированная

Международное непатентованное наименование – Вакцина против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированная

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций (инактивированная вакцина). Вакцина изготовлена из анатоксина *Cl. perfringens* тип С (≥ 10 МЕ) и протективных адгезивных антигенов *E.coli* K88 (8%) и K99 (8%), инактивированных формалином (0,3%) и адсорбированных на геле гидроокиси алюминия (20%).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию светло-желтого цвета с серо-белым осадком, легко разбивающимся при взбалтывании в равномерную взвесь. Срок годности вакцины – 18 мес от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в день вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 30 доз (90 мл) в стеклянные или полимерные флаконы вместимостью 100,0 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Одна коммерческая доза составляет 3 мл. Флаконы с вакциной упакованы в картонные или пенопластовые (коробки) ящики с разделительными перегородками, обеспечивающими сохранность вакцины. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцину во флаконах с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, без маркировки, подвергшуюся замораживанию, с истекшим сроком годности, измененным внешним видом, а также не использованную в день вскрытия флакона, бракуют, обезвреживают кипячением в течение 15 минут и утилизируют. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Вакцина против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированная – иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунитета у свиноматок на 10-12 сутки после второй иммунизации, который сохраняется в течение 6 месяцев. Колостральный иммунитет у поросят, полученных от иммунизированных животных, сохраняется до 1,5 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактической иммунизации супоросных свиноматок в хозяйствах, неблагополучных по анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозу, для создания колострального иммунитета у новорожденных поросят.

12. Запрещено иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. Вакцину вводят супоросным свиноматкам внутримышечно в область верхней трети шеи (за ухом) в дозе по 3 мл двукратно: первый раз - за 50-55 суток до опороса, второй раз - за 30-35 суток до опороса.

Вакцинацию проводят с соблюдением общепринятых правил асептики и антисептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

Перед применением флаконы с вакциной тщательно взбалтывают.

14. Симптомов анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и повторной вакцинации не установлено.

16. Не подлежат вакцинации свиноматки в последний месяц супоросности, лактирующие животные и подсосные поросята.

17. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза свиней. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. После введения вакцины у некоторых свиноматок возможно кратковременное повышение температуры тела или местная воспалительная реакция, исчезающая через 2-5 суток. Появляющаяся у отдельных животных аллергическая реакция на введение препарата не может служить основанием для предъявления рекламации.

При иммунизации супоросных свиноматок необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать аборт. После проведения вакцинации не допускать резкого охлаждения или перегревания животных.

19. Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

20. Продукты убоя от вакцинированных животных используют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированной: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированной, утвержденная Россельхознадзором 25 октября 2013 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации № 1-2.7/02074

Номер регистрационного удостоверения

Генеральный директор