

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

13 АВГ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«В-Траксим 2С Zn-260, код M60-5020EU»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00820**

Торговое наименование кормовой добавки:

«В-Траксим 2С Zn-260, код M60-5020EU» («В-Traxim 2C Zn-260, code M60-5020EU»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

Хелатный комплекс цинка с аминокислотой (глицин) – 94-100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание цинка – 25-28 %, глицина – 28-32 %, массовая доля влаги – не более 6 %.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 25 кг в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки: порошок белого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

36 месяцев с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 30 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка «В-Траксим 2С Zn-260, код M60-5020EU» является источником биодоступного цинка в хелатной форме. Цинк участвует в обмене веществ, синтезе рибонуклеиновой кислоты (РНК), активизирует многие ферменты. Цинк необходим для процессов костеобразования, кроветворения и развития эпидермальных тканей. Цинк оказывает положительное влияние на активность половых гормонов и гонадотропных гормонов гипофиза, играет важную роль в процессах оплодотворения и воспроизводства животных. Участвует в регулировании газового, водного, углеводного, минерального и азотного обмена, служит катализатором в окислительно-восстановительных процессах, повышает физиологическую активность витаминов, увеличивает силу фагоцитоза. Применение кормовой добавки повышает продуктивность, обеспечивает высокие темпы роста и развития сельскохозяйственных животных и птицы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для обогащения цинком рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также собак и кошек.

Показания для применения: недостаточное количество цинка в рационе, нормализация обмена веществ.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании на слизистые оболочки, в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- для лактирующих коров, бычков на откорме: 90-230 г/т корма;
- для телят до 6 месяцев: 150 - 230 г/т корма;
- для поросят-отъемышей: 190-310 г/т корма;
- для супоросных и лактирующих свиноматок, свиней на откорме: 190-310 г/т корма;
- для кур-несушек, цыплят-бройлеров, индеек: 110-300 г/т корма;
- для лактирующих овец: 80-150 г/т корма;
- для кошек: 250-330 г/т корма;
- для собак: 420-500 г/т корма.

Способы применения: вводят в премиксы, белково-витаминно-минеральные концентраты или комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Вводят в корма и премиксы с учетом содержания цинка в кормах и нормами кормления сельскохозяйственных животных и птицы.

Продолжительность применения: на протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика: «PANCOSMA France S.A.S.», Z.I. d'Arlod, Bellegarde-sur-Valserine, 01200 Valserhone, France (Франция).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя: «inprotec GmbH», Neuer Weg 1, 79423 Heitersheim, Germany (Германия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя: «inprotec GmbH», Neuer Weg 1, 79423 Heitersheim, Germany (Германия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду: Кормовая добавка «В-Траксим 2С Zn-260, код M60-5020EU» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.