

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тронцила для дегельминтизации собак

(организация-разработчик: ООО «Ветбиохим»,  
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер., 3/9, стр. 2)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тронцил (Troncil).  
Международное непатентованное наименование: празиквантел, пирантел эмбонат и фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Тронцил в качестве действующих веществ в 1 таблетке содержит празиквантел – 50 мг, пирантел эмбонат – 144 мг и фебантел – 150 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу, микрокристаллическую целлюлозу, поливинилпирролидон, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, аэросил и крахмал картофельный.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.

Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают Тронцил расфасованным по 2, 4, 6, 8, 10 таблеток в контурные блистеры; по 10, 20, 50 таблеток в пластиковые контейнеры или стеклянные флаконы, которые помещают в картонные пачки. Блистеры по 10 таблеток упаковывают в картонные пачки по 1, 2 и 5 штук. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению.

5. Хранят Тронцил в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 20°C.

6. Тронцил следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Тронцил относится к комбинированным антигельминтным препаратам.

10. Фармацевтические субстанции – празиквантел, пирантел эмбонат и фебантел, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Multiceps multiceps*, *Mesocostoides* spp., а также антипротозойное действие в отношении возбудителя лямблиоза – *Giardia canis* (*Lamblia*).

Механизм антигельминтного действия входящих в состав лекарственного препарата активных веществ основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибировании фумарат-редуктазы и синтеза АТФ,

увеличении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

Антипротозойное действие препарата обусловлено способностью фебантела под действием ферментов простейших образовывать комплексные соединения с ДНК паразита, что вызывает ее деградацию, а также оказывать в комбинации с пирантелом цитотоксическое действие, приводящее к гибели простейших.

При пероральном применении лекарственного препарата празиквантел быстро всасывается в кишечнике и распределяется в органах и тканях, выводится из организма в основном с мочой в метаболизированной форме; пирантел эмбоат и фебантел частично всасываются в кишечнике и выводятся из организма в основном с фекалиями в течение 24-48 часов.

Тронцил по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Тронцил назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалёз) и цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, меноцестодоз), а также при гельминтозах, осложненных лямблиозом (ассоциативных гельминтозно-лямблиозных инвазиях).

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Тронцил не следует применять щенным сукам в первые две трети беременности и щенкам моложе 6-недельного возраста.

13. Тронцил при гельминтозах применяют собакам с 6-недельного возраста индивидуально однократно в следующих дозах:

| Масса животного | Доза препарата |
|-----------------|----------------|
| до 2 кг         | ¼ таблетки     |
| от 2 до 5 кг    | ½ таблетки     |
| от 5 до 10 кг   | 1 таблетка     |
| 20 кг           | 2 таблетки     |
| 30 кг           | 3 таблетки     |
| 40 кг и более   | 4 таблетки     |

При гельминтозах, осложнённых лямблиозом, Тронцил применяют в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного один раз в день в течение 3 дней подряд.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Препарат вводят принудительно на корень языка или с небольшим количеством корма (в куске колбасы, мяса, с фаршем, кашей)

С лечебной целью препарат применяют по показаниям, с профилактической целью – 1 раз в 3 месяца в терапевтической дозе, перед иммунопрофилактикой дегельминтизацию проводят за 10-14 суток.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Тронцил не следует применять щенным сукам в первые две трети беременности и щенкам моложе 6-недельного возраста.
17. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации Тронцил необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.
18. При применении Тронцила в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у собак, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
19. Тронцил не следует применять одновременно с пиперазином и средствами, ингибирующими холинэстеразу.
20. Тронцил не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Тронцилом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.  
Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тронцилом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной ООО «Ветбиохим», 355019, площадки производителя лекарственного г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18. препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, ООО «Ветбиохим», 105120, уполномоченной держателем или г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., владельцем регистрационного 3/9, стр. 2. удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Тронцила для дегельминтизации собак, утвержденная Россельхознадзором 11 мая 2012 г.

Номер регистрационного удостоверения 84-3-12.12-0430 МПВР-34.1/00812