

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

20 МАЙ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Сиберсил®»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00752

Торговое наименование кормовой добавки: «Сиберсил®» («Sibersil»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 г содержится действующее вещество: живые спорообразующие бактерии *Bacillus amyloliquefaciens* (штамм SB, ВКШМ-Б-09ГХ) не менее 5×10^9 КОЕ; вспомогательные вещества: лактоза (стабилизатор) 15-25 %, сыворотка молочная (наполнитель) до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание бактерий *Bacillus amyloliquefaciens* не менее 5×10^9 КОЕ/г, массовая доля влаги не более 10 %.

Указание массы кормовой добавки в упаковке:

По 1 кг в герметичные пакеты из комбинированной полимерной пленки на основе алюминиевой фольги; по 20 кг в полиэтиленовые мешки, вложенные в тканые мешки из полипропилена.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки: порошок от светло-бежевого до коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя, в чистых, защищенных от влаги помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от минус 30 °С до 30 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены содержанием живых спорообразующих бактерий *Bacillus amyloliquefaciens*, которые обладают антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способствуют стимуляции роста полезной микрофлоры кишечника птицы, нормализации процессов пищеварения.

Применение кормовой добавки способствует повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы, повышению естественной резистентности организма.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для нормализации процессов пищеварения, повышения продуктивности и сохранности цыплят-бройлеров и кур-несушек.

Показания для применения: нормализация процессов пищеварения, повышение продуктивности и сохранности цыплят-бройлеров и кур-несушек.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами для ветеринарного применения, кроме антибактериальных.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть проточной водой.

Режим дозирования:

- для цыплят-бройлеров: 100-200 г/т корма;
- для кур-несушек: 100-200 г/т корма.

Способы применения: кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

При грануляции комбикормов допускается нагревание до 90°C в течение 2-х минут.

Продолжительность применения: на протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО ПО «Сиббиофарм», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО ПО «Сиббиофарм», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО ПО «Сиббиофарм», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/2, 11/5, 11/6.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Сиберсил®» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.