

**Инструкция
по применению премикса «Борька»
для обогащения рационов свиней всех возрастов витаминами и микроэлементами**

(Организация – производитель: ООО «Агровит»,
Московская область)

I. Общие сведения

1. Премикс «Борька» (Premix «Borka») – добавка кормовая, предназначенная для обогащения рационов свиней всех возрастов витаминами и микроэлементами.

2. Премикс «Борька» - это многокомпонентная однородная смесь комплекса витаминов, минеральных веществ, антиоксиданта (эндокс) и наполнителя (мука известняковая, кальция фосфат кормовой, отруби пшеничные, тонкоизмельченные зерна пшеницы).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг премикса «Борька» содержится:

Таблица № 1

| Наименование биологически активных компонентов | Содержание в 1 кг премикса «Борька» | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| | Премикс 1% | Премикс 0,5% |
| Витамины: А, тыс. МЕ | 300,0 | 600,0 |
| Д3, тыс. МЕ | 50,0 | 100,0 |
| Е, г | 0,25 | 0,5 |
| В1, г | 0,1 | 0,2 |
| В2, г | 0,4 | 0,8 |
| В3, г | 1,0 | 2,0 |
| В5, г | 1,5 | 3,0 |
| В12, г | 0,0025 | 0,005 |
| Микроэлементы: Железо, г | 0,5 | 1,0 |
| Медь, г | 0,52 | 1,04 |
| Цинк, г | 2,2 | 4,4 |
| Марганец, г | 0,3 | 0,6 |
| Кобальт, г | 0,03 | 0,06 |
| Йод, г | 0,02 | 0,04 |
| Селен, г | 0,01 | 0,02 |
| Антиоксидант (эндокс), г | 3,0 | 6,0 |

Допустимые отклонения содержания микроэлементов от предусмотренных по рецептуре должны быть не более 10%, кобальта - не более 20%, витаминов - не более 15%.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду премикс «Борька» представляет собой порошок от кремового до коричневого цвета, без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов. Массовая доля влаги не более 13%. Частично растворим в воде.

4. Выпускается расфасованным по 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов, а также по 100,0 г, 150,0 г, 200,0 г, 300,0 г, 400,0 г, 500,0 г в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки, упакованные в бумажные трех-

или четырехслойные мешки или ящики из гофрированного картона массой брутто не более 25 кг.

Каждую упаковку маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения премикса, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения СТО, информации о соответствии, надписей «Для животных», «Беречь от влаги!» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят премикс «Борька» в упаковке производителя в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 10° С до 25° С и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Срок хранения премикса «Борька»:

- упакованного в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов массой не более 30 кг – 6 месяцев со дня изготовления;
- упакованного в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки массой 100,0 г, 150,0 г, 200,0 г, 300,0 г, 400,0 и 500,0 г – не более 9 месяцев со дня изготовления.

Не допускается применение премикса «Борька» с истекшим сроком хранения.

II. Биологические свойства

6. Биологические свойства премикса «Борька» обусловлены наличием в нем: витаминов (А, Д3, Е, группы В), которые нормализуют обмен веществ; минеральных веществ (микроэлементов), которые необходимы для укрепления костной и мышечной систем (марганец); для синтеза гемоглобина (железо); для кроветворения (медь, цинк); для воспроизводительных функций (cobальт, йод, селен). Все компоненты вводятся в оптимальных количествах и соотношениях.

7. Скармливание премикса «Борька» поросятам и свиньям способствует нормализации обмена веществ в организме, предупреждению заболеваний, вызванных дефицитом минеральных веществ и витаминов, повышению устойчивости организма к болезням, способствует повышению продуктивности, сохранности животных и эффективности использования корма, улучшению пищевой и технологической ценности мяса.

III. Порядок применения

8. Премикс «Борька» применяют для производства комбикормов и кормосмесей для обогащения рационов свиней всех возрастов витаминами и микроэлементами.

9. Премикс вводят в комбикорма из расчета 1,0 %, т.е 10 г премикса на 1 кг зернофуражда. Из 0,5 % премикса перед внесением в основной корм приготавливают 1 % премикс путем перемешивания с сухой пшеничной мукой любого сорта в пропорции 1:1.

В хозяйствах с небольшим поголовьем премикс вручную смешивается с сухими кормами. На крупных фермах для внесения в кормовую смесь используют серийные дозаторы и смесители.

Норма расхода 1% премикса составляет:

Таблица № 2

| Вид животного | Суточная доза г/гол |
|-----------------------------|---------------------|
| Поросята весом: 15-20 кг | 5,0-10,0 |
| 21-30 кг | 12,0 |
| 31-40 кг | 15,0 |
| 41-50 кг | 18,0 |
| 51-60 кг | 20,0 |
| 61-70 кг | 23,0 |

| | |
|---|-------|
| 71-100 кг | 25,0 |
| Свиноматки супоросные в первые 84 дня супоросности | 25-30 |
| Свиноматки супоросные в последние 30 дней супоросности и лактирующие свиноматки | 40-50 |
| Хряки | 25-35 |

Премикс скармливают, как правило, один раз в сутки в утреннее кормление, предварительно смешав его с кормом.

10. При использовании премикса «Борька» в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений у животных не отмечено. Противопоказания не выявлены.

11. Премикс «Борька» совместим со всеми ингредиентами кормов, кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

12. При использовании премикса «Борька» противопоказаний не установлено.

13. Мясо от животных после применения премикса можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

14. При работе с премиксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Следует использовать индивидуальные средства защиты: спецодежду (халат, шапочку или косынку), респираторы типа «Лепесток» или «РУ», резиновые перчатки, спецобувь.

15. В случае попадания пыли в дыхательные пути, пострадавшего следует вывести на свежий воздух, прополоскать рот водой или 2% раствором питьевой соды, при тошноте – промыть желудок.

При попадании пыли премикса в глаза, их следует промыть струей воды или 2% раствором питьевой соды, при раздражении – 30% раствором альбуцида.

16. Хранить премикс «Борька» необходимо в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО НПО «Гигиена – БИО» (Московская область, г.Балашиха) совместно с ООО «АгроВит» (Московская область).

Адрес организации-производителя: 140117, Московская обл., Раменский район, с/о Юровский, за д. Загорново.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу предыдущая инструкция, утвержденная Россельхознадзором 25 апреля 2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер: ПБ № 02-12/00997