

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

19 ДЕК 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«АВИТАМ® Кунда Ниацин»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00922**

Торговое наименование кормовой добавки:
«АВИТАМ® Кунда Ниацин» («AVITAM® Kunda Niacin»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
Ниацин (полученный методом химического синтеза) – 99,0-100,0 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание ниацина – 99,0-100,0 %, содержание влаги – не более 1,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг в многослойные бумажные мешки с алюминиевым вкладышем; по 20 кг, 25 кг в картонные коробки с полиэтиленовым вкладышем; по 500 кг в биг-бэги с алюминиевым вкладышем.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Порошок белого или почти белого цвета.

Срок годности кормовой добавки:
3 года с даты производства.
Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке производителя, в хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 25 °С до 30 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в недоступном для детей месте.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Ниацин в составе кормовой добавки «АВИТАМ® Кунда Ниацин» способствует удовлетворению потребностей организма в никотиновой кислоте. Поступившая в организм никотиновая кислота всасывается в желудке и двенадцатиперстной кишке, затем поступает в печень, где превращается в амидникотиновую кислоту, приобретающую биологическую активность за счет соединения с нуклеотидами и образующую кофермент НАД⁺ и НАДФ⁺, которые принимают участие в обмене углеводов, липидов, аминокислот и нуклеиновых кислот. Ниацин выполняет ключевые функции в энергетическом обмене.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, рыб, собак и кошек, витамином В₃.

Показания для применения:

Обогащение рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, рыб, собак и кошек, витамином В₃, повышение сохранности и продуктивности.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить в спецодежде и средствах индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- цыплятам-бройлерам: 30-40 мг/кг корма;
- курам-несушкам: 20-30 мг/кг корма;
- пороссятам-отъемышам: 20-40 мг/кг корма;
- свиньям на откорме: 20-30 мг/кг корма;
- лактирующим и сухостойным коровам: 50-60 мг/кг корма;
- телятам: 20-40 мг/кг корма;
- кошкам: 45-60 мг/кг корма;
- собакам: 20-25 мг/кг корма;
- рыбам семейства лососевых, карповых, осетровых: 20-200 мг/кг корма;
- креветкам: 20-200 мг/кг корма.

Количество вводимой кормовой добавки определяют исходя из рекомендованных норм кормления животных и содержания витамина В₃ в рационе.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в комбикорма и премиксы на премиксных и комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии многоступенчатого смешивания. При гранулировании комбикорма, допускается нагрев до 100 °С в течение 10 минут.

Продолжительность применения:

- для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб: на протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами;
- для собак и кошек: на протяжении периода жизни животного.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**

ООО «Кормовит», 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 4.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:

«Shandong Kunda Biotechnology Co., Ltd», No. 47 Nan Yi Huan Road, Economic Development Zone, Yishui County, Linyi, Shandong, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«Shandong Kunda Biotechnology Co., Ltd», No. 47 Nan Yi Huan Road, Economic Development Zone, Yishui County, Linyi, Shandong, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «АВИТАМ® Кунда Ниацин» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.