

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Деликса-Ф для борьбы с эктопаразитами
у собак и кошек
(организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. С-Петербург)

I. Общие сведения

1. Деликс-Ф (Delix-F).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения, содержащий в качестве действующего вещества фипронил ($C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$) – 8%, а также вспомогательные компоненты бутилгидроксипантолат – 0,02%, бутилгидрокситолуол – 0,01% и метилкарбитол до 100%.

3. Выпускают Деликс-Ф расфасованным в полиэтиленовые пипетки с отламываемым кончиком, помещенные в картонные коробки. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

4. Хранят Деликс-Ф в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰С до 30⁰С.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности. Деликс-Ф с истекшим сроком утилизируют с бытовыми отходами.

II. Фармакологические свойства

7. Фипронил, входящий в состав препарата блокирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты паразита и обладает выраженным инсектицидным и акарицидным действием в отношении вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлителлы, отодектосы), паразитирующих на собаках и кошках.

Деликс-Ф не обладает системным действием, а накапливается в эпидермесе и сальных железах животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на эктопаразитов. Препарат в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и обеспечивает защиту животных от эктопаразитов.

Деликс-Ф по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам – 4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, не оказывает кожно-резорбтивного, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. При попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

Токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Деликс-Ф применяют для борьбы с блохами, вшами, власоедами и клещами (иксодовые, хейлителлы, отодектосы) собак и кошек, путем топикального (точечного) нанесения препарата на кожу.

9. Деликс-Ф не разрешается применять щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста.

10. Перед обработкой у пипетки отламывают кончик, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек.

В зависимости от вида и массы животного используют пипетки Деликс-Ф различного объема:

Вид животного	Объем используемой пипетки (мл)	Количество пипеток (штук)
Собаки:		
От 2 до 10 кг	0,65	1
От 10 до 20 кг	1,0	1
От 20 до 40 кг	1,0	2
Более 40 кг	1,0	4
Кошки:		
От 0,5 до 3 кг	0,5	1
Более 3 кг	1,0	1

Продолжительность защиты животных от клещей: у кошек – до 6 недель, у собак – не менее 1 месяца. Продолжительность защиты животных от блох: у кошек – 6 недель у собак – до 3 месяцев.

При риске нахождения животного в высоко инвазированной клещами местности, а также при сильном поражении животного вшами, блохами, власоедами, рекомендуется производить обработку один раз в месяц.

Деликс-Ф применяют для лечения отодектоза (ушной чесотки). С этой целью закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание, остаток нанести на кожу между лопаток (однократная обработка).

Не рекомендуется мыть животных в течение 48 часов после обработки.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений у животных при применении Деликса-Ф согласно настоящей инструкции, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фипронилю, возможны индивидуальные реакции (избыточное слюноотделение, раздражение кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При работе с Деликс-Ф следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с лекарственными препаратами.

16. Не следует гладить животное в течение 24 часов после обработки.

17. Пустые пипетки-капельницы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

18. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», 192171, г. С-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, Лит. А.

Инструкция разработана: ЗАО «Бионикс», 195279, г. С-Петербург, Ириновский проспект д. 23, к. 1, пар. 5а.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер *ПВР-2-8.0/02634*