

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ПрателTM таблеток
для дегельминтизации собак и кошек

(Организация-разработчик: «Elanco Europe Ltd», Lilly House, Priestley Road,
Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, UK / «Эланко Юроп Лтд», Лилли Хаус,
Пристли Роуд, г. Бейсингсток, графство Гэмпшир, RG24 9NL,
Великобритания)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ПрателTM таблетки (PratelTM tabulettae).

Международное непатентованное наименование: пирантел, празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

ПрателTM таблетки в качестве действующих веществ в 1 таблетке содержат пирантел эмбонат – 144 мг и празиквантел – 50 мг, а в качестве вспомогательных веществ: микрокристаллическую целлюлозу, лактозу, натрия сахарин, натрия крахмал гликолят и кукурузный крахмал, повидон, натрия кроскармеллозу, кремния диоксид и магния стеарат

3. По внешнему виду препарат представляет собой круглые таблетки бледно-желтого цвета с крестообразной насечкой с одной стороны.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают ПрателTM таблетки, расфасованным по 10 таблеток в блистеры из фольги, помещенные по 1 или по 10 блистеров в картонные пачки.

5. Хранят ПрателTM таблетки в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. ПрателTM таблетки относится к комбинированным антигельминтным лекарственным препаратам.

10. Комбинация входящих в состав препарата празиквантела и пирантела обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в том числе *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocestoides spp.*

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении цестод, повышает проницаемость мембран клеток гельминта для ионов кальция, вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, что приводит к гибели гельминтов.

Пирантел эмбоат (Е-1,4,5,6-тетрагидро-1-метил-2-{2-[2-тиенил]этонил} пиримидил) активен в отношении нематод, блокирует нейтромышечную передачу, нарушает проницаемость клеточных мембран, угнетает холинэстеразу, что вызывает паралич и гибель гельминтов.

При пероральном введении лекарственного препарата празиквантел хорошо всасывается в кишечнике, достигая максимальной концентрации в крови через 1-4 часа, связывается белками плазмы (до 80%), подвергается биотрансформации в печени с образованием неактивных моно- и полигидроксилированных метаболитов. Выводится из организма преимущественно с мочой, и в незначительных количествах – с фекалиями. Пирантел эмбоат плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится в основном в неизменной форме с фекалиями.

ПрателTM таблетки по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) в рекомендуемых дозах не оказывают сенсibilизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. ПрателTM таблетки назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз, дипилидиоз, эхинококкоз, мезоцестодоз).

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Не следует применять ПрателTM таблетки истощенным, больным инфекционными болезнями животным, а так же животным с выраженными нарушениями функции почек и печени.

13. ПрателTM таблетки применяют собакам и кошкам однократно, индивидуально в раздробленном виде с кормом или вводят принудительно на корень языка в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Вид и масса животного	Доза Прател TM таблеток (количество таблеток на животное)
Собаки:	
до 2 кг	$\frac{1}{4}$
2-5 кг	$\frac{1}{2}$
5-10 кг	1
10-20 кг	2
20-30 кг	3
30-40 кг	4
40-50 кг	5
Взрослые кошки	$\frac{1}{2}$
Котята	$\frac{1}{4}$

С лечебной целью ПрателTM таблетки применяют животным по показаниям однократно, с профилактической целью – один раз в квартал в терапевтической дозе.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, рвота и диарея.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Не следует применять ПрателTM таблетки щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста, самкам в первую половину беременности.

Беременным самкам препарат применяют в последнюю треть беременности, лактирующим – через 2-3 недели после родов под наблюдением ветеринарного врача.

17. При применении ПрателаTM таблеток следует придерживаться рекомендуемых сроков дегельминтизации. В случае пропуска очередной профилактической дегельминтизации ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении ПрателTM таблеток в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и развитии аллергических реакций его использование прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. ПрателTM таблетки не следует применять одновременно с антигельминтными средствами, содержащими пиперазин.

20. ПрателTM таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении ПрателTM таблеток следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

Запрещается использование пустой упаковки из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ПрателомTM таблетками.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению для ПрателTM таблеток для дегельминтизации собак и кошек, утвержденная Россельхознадзором 20 мая 2014 года.

Наименования	и	адреса	«Lek Pharmaceuticals, d. d.» / «Лек
производственных		площадок	Фармасьютикалс, д. д.»,
производителя		лекарственного	Verovskova 57, Ljubljana, 1526,
препарата	для	ветеринарного	Slovenia / Веровскова 57, Любляна,
применения.			1526, Словения.

Наименование,	адрес	организации,	ООО «Эланко Рус», 123317,
уполномоченной	держателем	или	Россия, г. Москва, Пресненская
владельцем	регистрационного		набережная, 10.
удостоверения	лекарственного		
препарата на	принятие	претензий от	
потребителя.			

Номер регистрационного удостоверения 825-3-474-3135 N17841-3-3.3/01453