

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Дермацина инъекционного
для борьбы с гиподерматозом, телязиозом и диктиокаулезом крупного рогатого скота,
эдемагенозом и цефеномиозом северных оленей

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим»,
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер., 3/9)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дермацин инъекционный (Dermacin inj.)

Международное непатентованное название: ивермектин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Лекарственный препарат в 1 мл содержит в качестве действующего вещества ивермектин - 0,1 мг, а в качестве вспомогательных веществ: изопропиловый спирт и триэтиленгликоль.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности Дермацина инъекционного при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Лекарственный препарат после вскрытия хранению не подлежит.

Запрещается использовать Дермацин инъекционный по истечении срока годности.

4. Дермацин инъекционный выпускают расфасованным по 10, 20, 50, 100, 200, 250, 450, 500 мл в стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон от 50 до 500 мл снабжают инструкцией по применению. Флаконы по 10 и 20 мл упаковывают в коробки или блистеры по 10 штук и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Дермацин инъекционный в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 30°C.

6. Дермацин инъекционный следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Дермацин инъекционный относится к противопаразитарным препаратам группы макроциклических лактонов.

10. Ивермектин, действующее вещество Дермацина инъекционного, стимулирует у клещей и насекомых выделение нервными окончаниями гамма-аминомасляной кислоты и усиливает её связь с рецепторами нервных клеток, блокируя прохождение нервных импульсов, вызывая паралич, а затем и гибель паразита.

При внутримышечном введении ивермектин быстро всасывается и его максимальная концентрация в крови достигается через 24-48 часов после введения. Ивермектин накапливается, в основном, в печени и жировой ткани, выделяется из организма преимущественно с калом.

Дермацин инъекционный по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Дермацин инъекционный предназначен для борьбы с гиподерматозом, телязиозом и диктиокаулёзом крупного рогатого скота, эдемагенозом и цефеномиозом оленей.

12. Противопоказанием к применению Дермацина инъекционного является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе).

13. Дермацин инъекционный вводят однократно крупному рогатому скоту под кожу в область нижней трети шеи: взрослым животным в дозе 3 мл, молодняку до 150 кг - 2 мл; оленям массой до 50 кг – 1 мл, более 50 кг – 2 мл подкожно или внутримышечно.

С целью ранней химиотерапии гиподерматоза и диктиокаулеза обработку крупного рогатого скота проводят осенью в октябре - ноябре, оленей против эдемагеноза и цефеномиоза в зависимости от зоны: в августе - октябре. При этом обработке подвергают всё поголовье стада.

Весной (в конце марта – начале апреля) при появлении у крупного рогатого скота на спине свищевых капсул (желваков) с экстенсивностью поражения более 3% обрабатывают всё поголовье, в мае - только поражённых личинками животных. Больным диктиокаулёзом животным Дермацин инъекционный применяют однократно в июле, августе, сентябре.

С лечебной целью обработку крупного рогатого скота против телязиоза проводят по показаниям: при появлении клинических признаков (гиперемия, конъюнктивиты, слёзотечение, серозное или серозно-гнойное выделение, помутнение роговицы, светобоязнь) и (или) обнаружении личинок или молодых телязий в конъюнктивальной полости. С профилактической целью обработку животных проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, тремор, усиленная саливация, отказ от корма.

15. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

16. Лекарственный препарат можно применять беременным и лактирующим животным, а также молодняку.

17. Лекарственный препарат применяется однократно.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь), обработку прекращают и назначают средства симптоматической терапии.

19. Дермацин инъекционный не следует применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами. Применение Дермацина инъекционного не исключает применения лекарственных средств других групп. Совместим с витаминами и кормовыми добавками.

20. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после применения лекарственного средства. При вынужденном убое ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным. Молоко от обработанных животных используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Дермацином инъекционным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. Лица, работающие с Дермацином инъекционным, должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дермацином инъекционным. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Ветбиохим» - 355019,
г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «Ветбиохим» - 105120,
г. Москва, 3-й Сыромятнический пер.,
3/9.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Дермацина инъекционного для борьбы с гиподерматозом, диктиокаулёзом крупного рогатого скота и эдемагенозом и цефеномиозом северных оленей, утверждённая Россельхознадзором 28 марта 2012 года.