

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Элвестина® у собак, кошек, декоративных грызунов и хорьков для стимуляции роста и развития, профилактики расстройств пищеварения, коррекции обмена веществ

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Элвестин® (Elvestin®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

В качестве действующих веществ Элвестин® содержит матричные настойки растительного происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Acidum arsenicosum Ø=D2 – 0,1 нл, Colocynthis Ø=D1 – 10 нл, Echinacea purpurea Ø – 60 мкл, Lycopodium clavatum Ø=D1 – 4 нл, Phosphorus D26 – 12 мкл, Podophyllum peltatum Ø – 3 нл, Thuja occidentalis Ø – 0,6 мкл, Veratrum album Ø=D1 – 10 нл, Vincetoxicum Ø – 40 мкл, Se – 0,0002 г и вспомогательные вещества: спирт этиловый 96% – 93,75 мл, воду очищенную до 1000 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 30 суток. Элвестин® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Элвестин® расфасованным по 20 мл в полимерные флаконы с винтовой горловиной, комплектуемые навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и пробкой-капельницей. Флаконы поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Элвестин® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 25 °С.

6. Элвестин® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Элвестин® относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

10. Элвестин® оказывает регулирующее действие на обмен веществ, улучшает процессы пищеварения и усвоения корма, стимулирует созревание сенсорно-эмоционально-двигательных рефлексов в ранний постнатальный период.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

11. Элвестин® назначают собакам, кошкам, декоративным грызунам и хорькам для профилактики расстройств пищеварения, стимуляции роста и развития в ранний постнатальный период, для коррекции обмена веществ, в том числе во время беременности.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. Элвестин® применяют животным перорально 1 раз в сутки в течение 10-14 дней в следующих разовых дозах на животное:

- щенкам, котят, декоративным грызунам и хорькам – 1-2 капли/животное;
- взрослым собакам, кошкам – 10 капель/10 кг массы животного.

14. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Противопоказаний и особенностей применения Элвестина® самкам в период беременности и лактации не установлено.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Элвестина® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Элвестина® не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

20. Элвестин® не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Элвестином® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Элвестина® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Номер регистрационного удостоверения 32-3-6.14-2170 ЛПВР-3-117/02322

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Элвестина®, утвержденная Россельхознадзором 13 августа 2014 г.