

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

29 НОЯ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Левибио»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00897**

Торговое наименование кормовой добавки: «Левибио» («Levibio»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 г содержится действующее вещество: высушенная живая дрожжевая культура *Saccharomyces cerevisiae* (штамм VCIS-0010224) не менее $1,0 \times 10^9$ КОЕ; вспомогательные вещества: внутренние оболочки инаktivированных дрожжевых клеток *Saccharomyces cerevisiae* 2-5 %, стеариновая кислота (защитная оболочка) 38-46 %, крошка диатомитовая (наполнитель) до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание *Saccharomyces cerevisiae* – не менее $1,0 \times 10^9$ КОЕ/г, массовая доля влаги не более 8,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 5 кг в полипропиленовых мешках; по 25 кг в герметичных многослойных бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом.

Срок годности кормовой добавки:

18 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4 °С до 30 °С и относительной влажности не более 60 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки:

Биологические свойства кормовой добавки «Левибио» обусловлены входящей в состав дрожжевой культурой *Saccharomyces cerevisiae*, которая способствует нормализации и стимулированию роста полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, расщепляющей клетчатку и улучшающей переваримость грубых кормов; стимулируют процессы утилизации молочной кислоты в рубце, оптимизируют pH, снижая риск возникновения ацидозов. Обеспечивается улучшение пищеварения и усвояемости питательных веществ, тем самым повышается эффективность использования растительных кормов в рационе.

Внесение кормовой добавки «Левибио» в корма нормализует обмен веществ, повышает сохранность и продуктивность, улучшает качество продукции.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для оптимизации процессов пищеварения, повышения продуктивности жвачных животных и лошадей.

Показания для применения:

Улучшение пищеварения, улучшение переваримости питательных веществ корма, повышение продуктивности жвачных животных и лошадей.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Вид животных	Нормы ввода
Дойные коровы	10 г/голову в сутки
Крупный рогатый скот на откорме	2 г/100 кг массы тела в сутки
Телята (весь период выращивания)	2-10 г/голову в сутки
Лошади	10-15 г/голову в сутки
Овцы, козы (в период лактации)	2-5 г/голову в сутки

Способы применения:

Кормовая добавка вводится в корм на комбикормовых заводах или в комбикормовых цехах фермерских хозяйств с использованием технологий смешивания, обеспечивающих равномерное распределение кормовой добавки.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «ВИК – здоровье животных», 140050, Московская область, г. Люберцы, дачный пос. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «НПФ ВИК», 308519, Белгородская область, р-н Белгородский, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «НПФ ВИК», 308519, Белгородская область, р-н Белгородский, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Левибио» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.