

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей
для регуляции половой охоты у сук и кобелей

(организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей
(SEX BARRIER® guttae ex canis feminae et canis musculi).

Международное непатентованное наименование действующих веществ:
мепрегнолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

СЕКС БАРЬЕР® капли содержит в качестве действующих веществ
мепрегнолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол. Выпускают препарат
в двух модификациях (дозировках): СЕКС БАРЬЕР® капли для сук, с
содержанием в 1 мл мепрегнолацетата водорастворимого – 2,0 мг и
этинилэстрадиола – 0,02 мг; СЕКС БАРЬЕР® капли для кобелей, с
содержанием в 1 мл мепрегнолацетата водорастворимого – 6,0 мг и
этинилэстрадиола – 0,30 мг; в качестве вспомогательного вещества препарат
содержит: оливковое масло (или ПЭГ-400).

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой
прозрачную жидкость светло-желтого, зеленовато-желтого или золотисто-
желтого цвета в случае применения оливкового масла, в случае применения
ПЭГ – бесцветную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения – 3 года со дня производства.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей
запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей
выпускают расфасованным по 2, 3 и 5 мл в полимерные или стеклянные
флаконы с капельницей. Флакон плотно укупоривают навинчиваемой
крышкой с контролем первого вскрытия, флакон упаковывают в блистер и
поштучно упаковывают в картонные пачки с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегенолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов. Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегеноацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У кобелей резко снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей применяют сукам для угнетения полового возбуждения: прерывания и задержки течки, предотвращения нежелательной беременности; кобелям — для угнетения полового возбуждения и связанного с этим нежелательного поведения.

12. Лекарственный препарат противопоказан собакам породы грейхаунд, беременным и кормящим сукам, животным, не достигшим половой зрелости, а также при новообразованиях молочной железы, половых органов, при сахарном диабете и мочекаменной болезни.

13. Препарат вводят перорально, нанося на язык, на небольшой кусочек корма или лакомства. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу 1):

Таблица 1

Вид животного	Назначение препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Суки	Угнетение полового возбуждения	Прерывание течки	До 5 кг	1 капля	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала течки	1. Прекращение течки наступает после полного курса применения. 2. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения течки. 3. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год.
		Задержка течки	5,1 – 10 кг	2-4 капли			
	Предотвращение нежелательной беременности		10.1-30 кг	5-8 капель	Двакратно с интервалом 24 часа	За 7-14 дней до предполагаемой течки	1. Позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 2. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.
Кобели	Угнетение полового возбуждения и связанного с этим нежелательного поведения		До 5 кг	1 капля		не позднее 24 часов после спаривания	Более поздний срок дачи препарата значительно снижает эффект воздействия.
			5,1 – 10 кг	2-4 капли	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней		
			10.1-30 кг	5-8 капель			
			Свыше 30 кг	9+1 капля на каждые последующие 5 кг массы тела		Не позднее 2-х дней с момента начала полового возбуждения	1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала полового возбуждения прошло более 2-х дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную разовую дозу одновременно. 3. Успокоение животного наступает после полного курса применения. 4. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения полового возбуждения. 5. Повторный курс проводится по необходимости.

Молодым самкам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей беременным самкам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей. Пустую тару, из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса
производственных площадок
производителей лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

1. ООО «НВП «Астрафарм», 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 18 января 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-30-0069 НВП-2.1.5/01394