

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Варропола для профилактики и  
лечения варроатоза медоносных пчел  
(организация-производитель ООО "Структура", г.Москва)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Варропол (Varropol).

Международное непатентованное наименование: амитраз.

2. Лекарственная форма: пластины.

Варропол в качестве действующего вещества содержит амитраз – 60 мг/пластина, а в качестве вспомогательного вещества полихлорвиниловую основу. По внешнему виду препарат представляет собой прямоугольные пластины бело-желтого цвета размером 250 x 35 x 0,6 мм.

3. Варропол выпускают в герметично запаянных пакетах из полимерной металлизированной светонепроницаемой пленки, расфасованным по 10 пластин.

4. Хранят Варропол в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 1,5 года со дня производства. После вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

5. Варропол следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

7. Варропол относится к лекарственным акарицидным препаратам для пчел.

Амитраз, входящий в состав препарата – акарицид группы триазопентадиеновых соединений, обладает выраженным контактным и

системным действия в отношении клещей *Varroa destructor*. Механизм действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель клещей.

Варропол активен в течение всего периода нахождения пластин в улье (30-35 дней), что превышает продолжительность жизненного цикла клеща *Varroa* и, вследствие этого, уничтожаются клещи, паразитирующие на пчелах и выходящие из расплода.

По степени воздействия на организм Варропол относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах нетоксичен для пчел, не оказывает отрицательного действия жизнедеятельность и продуктивность пчелиных семей.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Варропол применяют для профилактики и лечения варроатоза медоносных пчел весной до начала медосбора и осенью после откачки товарного меда.

9. Запрещается использование Варропола для обработки семей медоносных пчёл в период активного медосбора.

10. Варропол применяют весной (после осмотра семей и массового облёта пчёл) до начала медосбора и осенью после откачки товарного мёда, путём размещения препарата внутри улья из расчёта 2 пластины на 10-12 гнездовых рамок. Пластины подвешивают вертикально между рамками улья в местах наибольшего скопления пчел таким образом, чтобы пчелы могли свободно перемещаться по их поверхности с обеих сторон. Для подвешивания пластин используют имеющиеся в них отверстия для держателей, которые могут быть изготовлены из проволоки. Препарат оставляют в ульях на 30-35 суток.

Для предупреждения повторного заболевания пчел обработку необходимо проводить одновременно на всей пасеке.

Во избежание попадания амитраза в товарный мёд обработки пчелиных семей прекращают не позднее, чем за 14 суток до начала главного медосбора. Повторное использование пластин не допускается.

11. Симптомы передозировки у пчел не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушения рекомендуемых сроков обработки пчелосемей, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

14. Варропол совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками, применяемыми в пчеловодстве, за исключением противоварроатозных лекарственных препаратов.

15. Побочных явлений и осложнений у пчёл при применении Варропола в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается, противопоказаний не установлено.

16. Мёд, полученный от семей пчёл после применения Варропола в соответствии с настоящей инструкцией, разрешается использовать на общих основаниях.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Варрополом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к амитразу следует избегать прямого контакта с Варрополом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустых пакетов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «Структура»; 111024, г. Москва, Перовский проезд, д. 2, кор. 4 .

Инструкция разработана ООО «Структура» (г. Москва).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Варропола, утвержденная Россельхознадзором 18.04.2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения