

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины ассоциированной против пастереллеза, гемофильного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней «ВЕРРЕС-ПГА»

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалей, д. 16)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата – ВЕРРЕС-ПГА

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата – Вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофильного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций (инактивированная вакцина). Вакцина изготовлена из культур штаммов *Pasteurella multocida* серогрупп А и D, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* серотипов 2 и 5, инактивированных формалином (в концентрации 0,3%) и адсорбированных гелевым адьювантом в количестве 15% от объема вакцины.

3. По внешнему виду вакцина должна представлять собой суспензию светло-серого цвета, при хранении которой допускается расслоение на две фракции: верхнюю - прозрачную и нижнюю – непрозрачную, а также выпадение небольшого осадка. Однородность вакцины восстанавливается при взбалтывании. Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в день вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 100,0 мл (50 иммунизирующих доз) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в картонные или пенопластовые коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими сохранность вакцины. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцину во флаконах с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, без маркировки, подвергшуюся замораживанию, с истекшим сроком годности, измененным внешним видом, а также не использованную в день вскрытия флакона, бракуют, обезвреживают кипячением в течение 15 минут и утилизируют. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. ВЕРРЕС-ПГА – иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунитета у животных через 14 суток после повторной вакцинации, который сохраняется не менее 6 месяцев.

Колостральный иммунитет у поросят, полученных от вакцинированных животных, сохраняется до 1,5 месяцев. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики пастереллеза, гемофильного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии у свиней.

12. Запрещено иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. Вакцинации подлежат супоросные свиноматки и поросята с 3-недельного возраста.

Вакцину вводят внутримышечно в области шеи (за ухом) двукратно с интервалом 14–18 сут в дозах: поросётам начиная с 3-недельного возраста по 2,0 мл, свиноматкам во второй половине супоросности по 3,0 мл.

Перед применением и в процессе применения флаконы с вакциной взбалтывают до образования однородной суспензии, в течение 12-14 часов до применения вакцину выдерживают при комнатной температуре (20-24°) С.

Вакцинацию проводят с соблюдением общепринятых правил асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

14. Симптомов пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и повторной вакцинации не установлено.

16. Схема применения вакцины у беременных животных отражена в п. 13. У супоросных свиноматок вакцинацию прекращают за 30-35 дней до опороса.

17. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. После введения вакцины у отдельных животных возможно кратковременное повышение температуры тела на 0,5-1,0 °С и угнетение. На месте инъекции возможна незначительная местная воспалительная реакция, которая исчезает в течение 4-10 сут и не может служить основанием для предъявления рекламации.

19. Запрещается использовать вакцину ВЕРРЕС-ПГА совместно с другими иммунобиологическими препаратами.

20. Продукты убоя от вакцинированных животных используют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть обеспечены спецодеждой (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, перчатки и др.). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина. При случайном введении препарата человеку, место инъекции необходимо немедленно обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Наименование и адрес производственной площадки производителя ВЕРРЕС-ПГА: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины ассоциированной против пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней «ВЕРРЕС-ПГА», утвержденная Россельхознадзором 30 декабря 2010 г.