

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

И.А.ВЛАСОВ

20.08.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Апидез®

(Организация-разработчик: АО «Агробιοпром»,
105064, Россия, г. Москва, ул. Казакова. д.6, стр. 1, Э 3, пом. XIII)

Номер регистрационного удостоверения: 47-3-13.19-4546 N 176P-3-13.19/03498

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Апидез®
(Apidez).

Международное непатентованное наименование: тимол, эфирное масло
пихты.

2. Лекарственная форма: пластина ветеринарная.

Апидез® в качестве действующих веществ в 1 пластине содержит:
тимол – 60 мг, эфирное масло пихты – 80 мг, а в качестве вспомогательных
веществ – этилцелозольв, шпон лущеный.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой
деревянные пластины от светло-желтого до коричневого цвета с запахом
эфирного масла.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении
срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не
подлежит.

4. Лекарственный препарат Апидез® выпускают расфасованным по 10
пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки.
Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке
производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно
от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных
для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат Апидез[®] отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Апидез[®] относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств.

10. Действующие вещества тимол и эфирное масло пихты оказывают выраженное акарицидное и репеллентное действие против взрослых форм *Varroa destructor*.

Эфирное масло являясь натуральным веществом, обладают помимо специфичного акарицидного эффекта также бактерицидными, фунгицидными и инсектицидными свойствами, помогая пчелиным семьям самостоятельно справиться с другими различными болезнями.

Применение Апидеза[®] не вызывает возникновения резистентных популяций клещей.

Апидез[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Апидез[®] не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей.

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Апидез[®] применяют для лечения и профилактики варроатоза медоносных пчел в весенний и осенний периоды при наличии минимального количества расплода.

12. Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

15. Апидез[®] применяют в весенний и осенний периоды. Лекарственный препарат размещают в ульях из расчёта 2 пластины на 10 – 12 гнездовых рамок. Для маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, которую размещают в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 4 соторамками, в сильной одну пластину между 3 и 4 соторамками, вторую пластину между 7 и 8 соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от количества печатного расплода, после чего их удаляют.

16. Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

17. Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

18. Апидез[®] не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

21. Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

АО «Агробιοпром», 143985
Московская область, Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

АО «Агробιοпром», 105064,
Россия, г. Москва, ул. Казакова.
д.6, стр. 1, Э 3, пом. XIII.