

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Сафродерм гель в качестве
антисептического, ранозаживляющего и противовоспалительного средства
для собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО фирма «НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сафродерм гель
(Saphroderm gel).

Международное непатентованное наименование: софора японская, крапива
двудомная.

2. Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Сафродерм гель содержит в 1 мл в качестве действующих веществ 25 мг
софоры японской и 10 мг крапивы двудомной, а в качестве вспомогательных ве-
ществ - 10 мг этилового спирта, 2 мг кальция глюконата, 10 мг натрия альгиново-
кислого и воду дистиллированную - до 1 мл.

По внешнему виду Сафродерм гель представляет собой однородную массу
желеобразной консистенции от желтовато-коричневого до коричневого цвета с
легким зеленоватым оттенком.

3. Сафродерм гель выпускают расфасованным по 10, 25 и 50 мл в стек-
лянные или полимерные банки или флаконы соответствующей вместимости, уку-
поренные пластмассовыми крышками.

4. Сафродерм гель хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, за-
щищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при темпе-
ратуре от 2⁰С до 25⁰С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хране-
ния – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Сафродерм гель по истечении срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для де-
тей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии
с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Сафродерм гель относится к антибактериальным лекарственным препа-
ратам растительного происхождения.

Входящие в состав лекарственного препарата биологически активные вещества обладают противовоспалительными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими и антисептическими свойствами, способствуют активизации процессов, эпителизации и регенерации поврежденных тканей.

Сафродерм гель по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Сафродерм гель применяют для лечения дерматитов неинфекционной этиологии, экзем, ожогов и трофических язв у собак и кошек.

9. Противопоказаний для применения препарата Сафродерм гель не установлено.

10. Препарат наносят тонким слоем, равномерно распределяя по всей пораженной поверхности, один-два раза в сутки в течение 3-10 дней до клинического выздоровления.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

12. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

13. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты.

15. Применение препарата Сафродерм гель не заменяет и не исключает использование антибактериальных и других лекарственных средств.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным, сроки убоя животных после применения препарата не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Сафродерм гелем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сафродерм гелем. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обра-

таться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустую тару из-под Сафродерм геля запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Адрес места производства: ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Инструкция разработана ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения:

Генеральный директор
ЗАО фирма Научно-производственный
ветеринарный и звероводческий
центр «Ветзвероцентр»

И.В. Слугин