

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Лакто-Стоп для подавления лактации и устранения симптомов ложной щенности у собак

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Лакто - Стоп (Lacto-Stop).

Международное непатентованное наименование: каберголин.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Лакто-Стоп в 1 мл в качестве действующего вещества содержит каберголин – 50 мкг и в качестве вспомогательного вещества – триглицериды средней длины цепи (MCTs).

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 дней.

Запрещается применение Лакто-Стопа по истечении срока годности.

4. Препарат расфасовывают по 5, 7, 10, 15 и 20 мл в темные полимерные флаконы, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия, каждый флакон упаковывают поштучно в картонную пачку в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Лакто-Стоп следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лакто-Стоп относится к гипопролактинемическим лекарственным препаратам.

10. Каберголин, входящий в состав препарата, является производным алкалоидов спорыньи, относится к агонистам дофаминовых рецепторов пролонгированного действия. Обладает стимулирующей активностью на дофаминовые рецепторы гипоталамо-гипофизарной системы, участвующие в

секреции основного гормона лактогенеза пролактина и оказывает тормозящее влияние на его выделение. Влияния на другие эндокринные процессы не оказывает.

Лакто-Стоп подавляет лактацию, предотвращает увеличение молочных желез и профилактирует развитие лактационного мастита. Снижение уровня пролактина способствует быстрому исчезновению признаков ложной беременности и изменений в поведении животного.

Равновесная концентрация каберголина при применении Лакто-Стопа на протяжении недели превышает в 2 – 3 раза концентрацию гормона после однократного применения препарата. Из организма каберголин выводится главным образом в виде метаболитов с мочой (22%) и фекалиями (60%) в течение 20 дней; менее 4% обнаружено в моче в неизменной форме. Связывание каберголина с белками плазмы составляет 40 – 42 % и не зависит от его плазменной концентрации. Максимальный эффект после применения препарата отмечается через 48 ч, действия каберголина после однократного применения продолжается до 14 дней, для достижения более длительного терапевтического эффекта применение препарата необходимо продолжать в течение 4 – 6 дней.

Лакто-Стоп по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и sensibilizing действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Лакто-Стоп назначают сукам для подавления лактации и устранения симптомов ложной щенности по клиническим показаниям (например, ранний отъем щенков), а также при гиперпролактинемии идиопатической или вызванной аденомой гипофиза.

12. Противопоказанием к применению препарата является артериальная гипотензия.

13. Препарат применяют перорально с кормом или вводят принудительно на корень языка 1 раз в день в течение 4 – 6 дней в дозе 0,1 мл (3 капли) на 1 кг массы животного.

14. При передозировке препарата возможны: отечность слизистой оболочки носовой полости, сонливость, кратковременная потеря сознания. В этом случае животному назначают средства симптоматической терапии.

15. При первом приеме препарата у животного возможны гиперсаливация и рвота, проходящие самопроизвольно без применения лекарственных препаратов.

16. Запрещается применение Лакто-Стопа во время беременности из-за вероятности аборта.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата, его применение при необходимости возобновляют, в тех же дозировках и по той же схеме.

18. При применении Лакто-Стопа в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у собак, как правило, не

наблюдается. У некоторых животных первые два дня лечения возможно снижение аппетита, сонливость, что не требует отмены препарата.

19. Не следует применять Лакто-Стоп одновременно с антагонистами дофаминовых D2-рецепторов (производные фенотиазина, бутирофенона, тиоксантена, метоклопрамид). С осторожностью Лакто-Стоп применяют с препаратами, обладающими гипотензивным эффектом.

20. Лакто-Стоп не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Лакто-Стоп следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Лакто-Стопа следует избегать прямого контакта с препаратом.

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан»,
Московская область,
Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.
ООО НПО «Апи-Сан»,
Московская область,
Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Лакто-Стопа, утвержденная Россельхознадзором от 28 ноября 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2311-0496-N ПБР-3-2311/02975