

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Дермикоцида для лечения дерматофитозов
у пушных зверей и кошек

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим»,
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер., 3/9, стр. 2)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дермикоцид (Dermikocid).
Международное непатентованное название: гризеофульвин, новокаин, дексаметазон.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Дермикоцид в 100 мл содержит в качестве действующих веществ гризеофульвин - 8,0 г, новокаин - 0,5 г, дексаметазон - 0,01 г, а в качестве вспомогательных веществ - твин 80, димексид (диметилсульфоксид) и 1,2-полипропиленгликоль.
3. По внешнему виду Дермикоцид представляет собой суспензию от белого до светло - желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности. Срок годности лекарственного препарата после первого вскрытия - 28 суток при температуре от 0°C до 10°C.
4. Выпускают Дермикоцид расфасованным по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают в индивидуальные картонные коробки и снабжают инструкцией по применению.
5. Дермикоцид хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.
6. Дермикоцид необходимо хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Дермикоцид относится к комплексным лекарственным препаратам.
10. Входящий в состав лекарственного препарата гризеофульвин обладает фунгистатической активностью на различные виды дерматофитов, в том числе рода *Trichophyton* и *Microsporum*. Фунгистатическое действие связано с влиянием на микротубулярные белки клетки гриба, в результате чего происходит разрыв веретенообраз-

ных митотических структур и остановка митотического деления клеток гриба в метафазе, подавляет синтез белка, нарушает формирование клеточной стенки у хитинсодержащих грибов.

Новокаин оказывает местноанестезирующее действие. Накапливаясь в мембранах нервных волокон и окончаний, он взаимодействует с рецепторами, расположенными в потенциалзависимых натриевых каналах, снижает проницаемость мембран для ионов натрия, препятствуя возникновению потенциала действия и проведению болевого импульса.

Дексаметазон оказывает десенсибилизирующее, противошоковое, иммунодепрессивное, противоаллергическое, противовоспалительное действия. Ингибирует метаболизм арахидоновой кислоты, подавляет биосинтез простагландинов, лейкотриенов и других медиаторов воспаления и аллергии.

По степени воздействия на организм Дермикоцид относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

11. Дермикоцид применяют пушным зверям и кошкам для лечения трихофитии и микроспории, особенно в тех случаях, когда вакцинация животных противопоказана или малоэффективна.

12. Лекарственный препарат противопоказан при органических заболеваниях печени и почек.

13. Дермикоцид вводят животным внутримышечно в область бедра с соблюдением правил асептики в следующих дозах:

- взрослым пушным зверям и кошкам – 1,0-1,5 мл;
- щенкам пушных зверей и котят – 0,2-0,5 мл.

Перед применением флакон с лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть.

Дермикоцид применяют 2-3 кратно с интервалом 5 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают микроскопическими исследованиями соскобов кожи.

При тяжелом течении заболевания животному дополнительно применяют лекарственные препараты патогенетической и симптоматической терапии в соответствии с инструкциями по применению.

14. При передозировке у животных может наблюдаться тошнота, явления дезориентации, крапивница. В этом случае применение лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматические лекарственные препараты.

15. Особенности действия Дермикоцида при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата кормящим и беременным самкам, а также щенкам и котятм моложе 4-недельного возраста.

17. При пропуске одной или несколько доз Дермикоцида курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. При применении Дермикоцида в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, адреналин, кортикостероиды или другое симптоматическое лечение.

19. Сведения о несовместимости с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.
20. Дермикоцид не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Дермикоцидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.
22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. Лица, работающие с лекарственным препаратом, должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи. После работы с лекарственным препаратом необходимо вымыть руки с мылом.
23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их следует промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций и случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Ветбиохим» - 355019, г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Ветбиохим» - 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9, стр. 2.

С утверждением данной Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Дермикоцида для лечения дерматофитозов у пушных зверей, собак и кошек, утвержденная Россельхознадзором 18.12.2015 г.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-7.14-2301 N ПАП-339/02436