

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Офлосана для лечения животных, включая сельскохозяйственных птиц, при болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии

(организация-производитель ООО «Апи-Сан», Московская область)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Офлосан (Oflosan) - антибактериальное лекарственное средство в форме раствора для орального применения, предназначенное для лечения свиней, молодняка крупного и мелкого рогатого скота, сельскохозяйственных птиц, собак и кошек при инфекционных болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии.

2. Офлосан в качестве действующего вещества содержит офлоксацин - 100 мг/см³ и вспомогательные компоненты (спирт бензиловый, 1,2-пропиленгликоль и воду дистиллированную).

3. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета; при хранении допускается слабое помутнение, исчезающее после взбалтывания.

4. Выпускают Офлосан расфасованным по 5, 10, 20, 60, 100, 200 см³ в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости; по 500 см³ в стеклянные бутылки; по 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 и 5,0 дм³ в полимерные канистры или бутылки с навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Каждый флакон, бутылку и канистру маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия лекарственной формы, назначения, способа применения и объема лекарственного средства в упаковке, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия, обозначения ТУ, надписей «Для животных», «Перед применением взбалтывать» и сопровождают инструкцией по применению. Хранят лекарственное средство в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. По истечении срока годности Офлосан не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Офлоксацин, входящий в состав лекарственного средства, относится к группе фторхинолонов, обладает широким спектром антибактериального и

антимикоплазменного действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Campylobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus* spp., *Staphylococcus* spp. (включая пеницилиназопродуцируемые и метицилинустойчивые штаммы), а также *Mycoplasma* spp.

Механизм действия офлоксацина заключается в ингибировании активности фермента ДНК-гиразы (II тип топоизомеразы), влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

При пероральном введении офлоксацин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей организма, достигая наивысшего уровня в легких, печени и почках.

Максимальная концентрация офлоксацина в сыворотке крови отмечается через 1,5-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов. Выводится офлоксацин в основном в неизмененном виде (до 80%) и частично в виде метаболитов, преимущественно с мочой и желчью.

6. Офлосан по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Офлосан назначают с лечебной целью телятам, ягнятам, свиньям, собакам, кошкам и сельскохозяйственным птицам при респираторных, желудочно-кишечных, мочеполовых инфекциях, артритов, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, септицемии, некротическом энтерите, перитоните, смешанных и вторичных инфекциях при вирусных болезнях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к офлоксацину.

8. Офлосан применяют животным перорально один раз в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- телятам, ягнятам, свиньям, собакам и кошкам - 0,5 мл на 10 кг массы животного;

- бройлерам, мясным индейкам, родительскому бройлерному стаду - 50 мл на 100 л воды для поения.

При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний птиц рекомендуемая доза Офлосан составляет 100 мл на 100 л воды для поения и продолжительность курса лечения - 5 дней.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птиц в течение суток.

9. При применении Офлосана в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений) использование лекарственного средства прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

10. Не допускается применение Офлосана курам-несушкам, в связи с

накоплением офлоксацина в яйцах, взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением, самкам в период беременности и лактации, животным с выраженными нарушениями развития хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, а также щенкам собак и котят до окончания периода роста.

Не следует применять Офлосан одновременно с левомицетином, макролидами, циклоспоринами и тетрациклинами, теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и кальция, которые, связываясь с офлоксацином, препятствуют его адсорбции.

11. Убой телят, ягнят и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, птицы - не ранее, чем через 11 суток после последнего применения лекарственного средства.

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения установленных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Офлосаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

13. Запрещается использование пустой тары из-под лекарственного средства для бытовых целей.

14. Офлосан следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Апи-Сан» (г. Москва).

Организация-производитель ООО «Апи-Сан», Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый Милет, Полтевское шоссе, 4

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер *ПВР-2-14.9/02512*

Генеральный директор
ООО «Апи-Сан»

А.А.Смирнов