

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Палочек внутриматочных с ихтиолом для профилактики и лечения воспалительных процессов матки у коров, овец и коз

(организация-разработчик: ЗАО НПП «Агрофарм»,
г. Воронеж, Воронежская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Палочки внутриматочные с ихтиолом (*Bacilli intrauteri cum Ichthyolo*).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол.

2. Лекарственная форма: суппозитории для внутриматочного введения.

Палочки внутриматочные с ихтиолом в качестве действующего вещества в одной палочке массой 10 г содержат ихтиол (аммониевую соль сульфокислот сланцевого масла) – 1 г, а также вспомогательные компоненты: полиэтиленоксид 1500 – 8,55 г, полиэтиленоксид 400 – 0,45 г. По внешнему виду препарат представляет собой палочки цилиндрической формы с заостренным концом темного бурого цвета.

3. Палочки внутриматочные с ихтиолом выпускают расфасованными по 5 штук в контурную ячейковую упаковку или в двойной полиэтиленовый пакет, запаянный термическим способом или закрытый защелкой «гриппер».

4. Палочки внутриматочные с ихтиолом хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 до 20°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 2 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки лекарственный препарат можно использовать в течение 1 месяца.

Палочки внутриматочные с ихтиолом запрещается применять по истечении срока годности.

5. Палочки внутриматочные с ихтиолом хранят в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакологическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства.

Ихтиол - аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла – относится к антисептическому средству, содержащему серу. За счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, ихтиол оказывает антимикробное, противопаразитарное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, местноанестезирующее и кератопластическое действие. При непосредственном действии на кожу и слизистые вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул. Благоприятно влияет на область воспаления кожи и подкожных слоев: регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение, улучшает обмен веществ.

Полиэтиленоксидная основа оказывает дегидратирующее действие.

При внутриматочном введении препарата ихтиол оказывает противовоспалительное действие в основном в эндометрии.

Выводится ихтиол из организма животного преимущественно с вагинальным секретом.

Палочки внутриматочные с ихтиолом по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007 относятся к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендованных дозах не оказывают sensibilizing действия.

III. Порядок применения

8. Палочки внутриматочные с ихтиолом применяют коровам, овцам и козам для лечения и профилактики воспалительных процессов матки после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при послеродовых эндометритах.

9. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ихтиолу.

10. Препарат вводят в полость матки:

- с лечебной целью: коровам – по 3-5 палочек, овцам и козам – 1-2 палочки через каждые 24 часа до клинического выздоровления (но не более 5 раз);
- с профилактической целью (после оказания родовспоможения или оперативного отделения последа): коровам – по 3-5 палочек, овцам и козам – 1-2 палочки однократно.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. Палочки вводят в шейку матки рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового использования, или с помощью корнцанга и проталкивают в полость матки

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении Палочек внутриматочных с ихтиолом в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных возможны аллергические реакции. В этих случаях препарат отменяют и назначают животному симптоматические средства.

15. Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств.

16. Молоко, полученное от животных во время лечения и в течение 2 суток после последнего применения Палочек внутриматочных с ихтиолом, используют в корм животным после термической обработки. Использование молока в пищу людям допускается через 2 суток после последнего введения препарата.

Мясо животных, убитых в период лечения и в течение 2 суток после последнего применения препарата, используют для производства мясокостной муки. Использование мяса в пищу для людей допускается через 2 суток после последнего введения препарата.

IV. Меры личной профилактики

17. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Палочек внутриматочных с ихтиолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды.

19. Пустые пакеты из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО НПП «Агрофарм», 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б.

Инструкция разработана ЗАО НПП «Агрофарм» (394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению палочек внутриматочных с ихтиолом для профилактики и лечения воспалительных процессов матки у коров, овец и коз, утвержденная Россельхознадзором 29 июня 2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения